

BemestingsWijzer

beemster A779

Uw klantnummer: 8617392

Klaver Makelaardij
afdeling Agrarisch
Trambaan 12
1733 AX NIEUWE NIEDORP

Eurofins Agro
Binnenhaven 5
NL - 6709 PD Wageningen

T monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T klantenservice: 088 876 1010
E agro@ftb.nl eurofins.com
I www.eurofins-agro.com

Kopie

Onderzoek: 780007/006775897 Datum monstername: 17-09-2025 Datum verslag: 07-10-2025

Resultaat	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Chemisch	N-totale bodemvoorraad	kg N/ha	9290	5250 - 7870				
	C/N-ratio		10	13 - 17				
	N-leverend vermogen	kg N/ha	170	95 - 145				
	S-plantbeschikbaar	kg S/ha	45	20 - 30				
	S-totale bodemvoorraad	kg S/ha	2025	1150 - 2130				
	C/S-ratio		47	50 - 75				
	S-leverend vermogen	kg S/ha	37	20 - 30				
	P-plantbeschikbaar	kg P/ha	13,2	5,8 - 9,6				
	P-bodemvoorraad	kg P/ha	1095	490 - 630				
	K-plantbeschikbaar	kg K/ha	310	225 - 355				
	K-bodemvoorraad	kg K/ha	815	815 - 1355				
	Ca-plantbeschikbaar	kg Ca/ha	105	230 - 540				
Fysisch	Ca-bodemvoorraad	kg Ca/ha	17990	15115 - 19240				
	Mg-plantbeschikbaar	kg Mg/ha	420	225 - 355				
	Mg-bodemvoorraad	kg Mg/ha	850	875 - 1460				
	Na-plantbeschikbaar	kg Na/ha	138	48 - 96				
	Na-bodemvoorraad	kg Na/ha	192	90 - 150				
	Zuurgraad (pH)		7,1	> 6,2				
	C-organisch	%	2,94					
	Organische stof	%	5,1					
	C/OS-ratio		0,58	0,45 - 0,55				
	Koolzure kalk	%	2,4	2,0 - 3,0				
	Klei (<2 µm)	%	38					
	Silt (2-50 µm)	%	42					
	Zand (>50 µm)	%	13					
	Slib (<16 µm)	%	51					
	Klei-humus (CEC)	mmol+/kg	310	> 280				
	CEC-bezetting	%	100	> 95				
	Ca-bezetting	%	90	80 - 90				
	Mg-bezetting	%	7,0	6,0 - 10				
	K-bezetting	%	2,1	2,0 - 4,0				
	Na-bezetting	%	0,8	1,0 - 1,5				
	H-bezetting	%	< 0,1	< 1,0				
	Al-bezetting	%	< 0,1	< 1,0				
	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	zeer goed	
Verkruimelbaarheid	rapportcijfer	4,6	6,0 - 8,0					
Verslumping	rapportcijfer	6,8	6,0 - 8,0					
Stuifgevoeligheid	rapportcijfer	9,2	6,0 - 8,0					

beemster A779

Resultaat	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Biologisch								
Microbiële biomassa	mg C/kg	645	255 - 765					
Microbiële activiteit	mg N/kg	60	58 - 97					
Schimmel/bacterie-ratio		0,9	0,6 - 0,9					

Bemestingsadviezen


Het resultaat wordt afgezet tegen het landbouwkundig streeftraject en krijgt een waardering: laag, vrij laag, goed, vrij hoog, hoog. Dit is geen beoordeling zoals bedoeld in ISO 17025 (par. 7.8.6).

Wetgeving

Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw voor 15 mei van het betreffende jaar in bij RVO. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:

P-bodemvoorraad (P-Al) = 78 mg P₂O₅/100 g
P-plantbeschikbaar (P-CaCl₂) = 4,1 mg P/kg

Wilt u weten hoeveel fosfaat u mag toedienen op basis van deze analyseresultaten? Check dan de fosfaatgebruiksnormen voor dit jaar via <https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/fosfaatklasse-grasland-bouwhand>



De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.

Oppervlakte (ha): 14,2

Hoekpunten perceel: 122932 512490, 122941 512492, 123001 512660, 122269 512942, 122202 512769, 122932 512490

Monsternamepunten: 122247 512865, 122259 512893, 122260 512766, 122296 512792, 122314 512852, 122345 512855, 122354 512757, 122397 512803, 122430 512745, 122434 512856, 122462 512825, 122469 512691, 122489 512798, 122492 512779, 122516 512739, 122531 512679, 122567 512726, 122573 512792, 122600 512672, 122605 512651, 122654 512772, 122717 512680, 122719 512634, 122742 512706, 122772 512632, 122779 512714, 122805 512601, 122858 512626, 122863 512572, 122903 512636, 122941 512578, 122952 512656

Vanwege ruimtegebrek is het mogelijk dat niet alle coördinaten van de vastgelegde hoekpunten van het perceel op dit verslag zijn weergegeven. Deze zijn echter wel opgeslagen in onze database.

Advies

Gewas: Wintertarwe

Er is door u geen bemestingsadvies aangevraagd!

Toelichting

Fosfaat:

Het berekende Pw-getal is voor dit perceel 59 mg P₂O₅/l.

Kali:

Het berekende K-getal is voor dit perceel 25

K-getal wordt niet meer gebruikt bij de adviesberekening.

Bodemleven:

De biologische bodemvruchtbaarheid wordt nu weergegeven via 3 kengetallen, te weten de microbiële biomassa, de microbiële activiteit en de schimmel/bacterie-ratio.

Op basis van de huidige kennis wordt een waardering gegeven die afhankelijk is van de hoeveelheid organische stof. Er wordt nu nog geen advies gegeven. Via diverse onderzoeksprojecten zal er meer informatie beschikbaar komen.

beemster A779

Contact & info Bemonsterde laag: 0 - 25 cm
 Grondsoort: Klei
 Monster genomen door: Eurofins Agro, Cees Balder
 Contactpersoon monstername: Klaas Riepma: 0652002101
 Bemonsteringsmethode: volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030 Q
 Specificatie monstername: Gestratificeerd

Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten is deze informatie verstrekt door de opdrachtgever en kan dit van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat:
 gewas, teelttype/ras.
 Dit geldt ook voor de bemonsteringsdiepte wanneer er sprake is van monstername door derden.

Methode	Resultaat	Eenheid	Methode	RvA
Analyse	N-totale bodemvoorraad	2890	mg N/kg	Em: NIRS
resultaten	S-plantbeschikbaar	14,0	mg S/kg	Em: CCL3
	S-totale bodemvoorraad	630	mg S/kg	Em: NIRS
	P-plantbeschikbaar	4,1	mg P/kg	Em: CCL3 (Gw NEN 15923-1)
	P-bodemvoorraad	78	mg P ₂ O ₅ /100 g	PAL1: Gw NEN 5793
	K-plantbeschikbaar	96	mg K/kg	Em: CCL3
	K-bodemvoorraad	6,5	mmol+/kg	Em: NIRS
	Ca-plantbeschikbaar	0,4	mmol Ca/l	Em: NIRS
	Ca-bodemvoorraad	297	mmol+/kg	Em: NIRS
	Mg-plantbeschikbaar	130	mg Mg/kg	Em: CCL3
	Mg-bodemvoorraad	21,7	mmol+/kg	Em: NIRS
	Na-plantbeschikbaar	43	mg Na/kg	Em: CCL3
	Na-bodemvoorraad	2,6	mmol+/kg	Em: NIRS
	Zuurgraad (pH)	7,1		Em: NIRS
	C-organisch	2,94	%	Em: NIRS
	Organische stof	5,1	%	Em: NIRS
	C-anorganisch	0,29	%	Em: NIRS
	Koolzure kalk	2,4	%	Em: NIRS
	Klei (<2 µm)	38	%	Em: NIRS
	Silt (2-50 µm)	42	%	Em: NIRS
	Zand (>50 µm)	13	%	Em: NIRS
	Klei-humus (CEC)	310	mmol+/kg	Em: NIRS
	Microbiële biomassa	645	mg C/kg	Em: NIRS
	Microbiële activiteit	60	mg N/kg	Em: NIRS
	Schimmel biomassa	197	mg C/kg	Em: NIRS
	Bacteriële biomassa	231	mg C/kg	Em: NIRS
	Bulkdichtheid	1286	kg/m ³	Em: NIRS

De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analysesresultaten.

Q Methode geaccrediteerd door RvA
 Em: Eigen methode, Gw: Gelijkwaardig aan, Cf: Conform

De resultaten zijn weergegeven in droge grond.

Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.

Het monster is geanalyseerd in het Eurofins Agro laboratorium in Wageningen, tenzij anders is vermeld.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het door Eurofins Agro bemonsterde object en op het materiaal dat in behandeling is genomen op 18-09-2025 en daarmee op het geanalyseerde monster. Nadere omschrijving van de toegepaste monstername en analysemethoden is te vinden op www.eurofins-agro.com. De meetonzekerheid van de methode is opvraagbaar bij Eurofins Agro.

De start van de analyse is gelijk aan de datum ontvangst.